

---

DEVOIR 1 - 24.09.09 - SUJET A.  
Terminale ES 1, Lycée Newton, Y. Angeli

---

**Exercice 1.** (8 points)

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 6$

1. Déterminer la fonction dérivée  $f'$  de la fonction  $f$ .
2. Dresser le tableau de variation de la fonction  $f$ .
3. Montrer que sur l'intervalle  $] - 6; -3[$ , l'équation  $f(x) = 0$  admet une solution  $\alpha$  unique.
4. Donner un encadrement de  $\alpha$  d'amplitude  $10^{-2}$
5. Combien  $f(x) = 0$  admet-elle de solutions sur  $\mathbb{R}$ ? Justifier.

**Exercice 2.** (4 points)


On munit le plan d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  d'unité graphique 1cm. On pose pour  $x \in [0, 5]$ ,

$$g(x) = \begin{cases} 2x - 2 & \text{si } x < 3 \\ x + 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

1. Tracer la courbe représentative de  $g$ .
2. La fonction  $g$  est elle continue sur  $[0, 5]$ ? Justifier.

**Exercice 3.** (4 points)

La figure représente une fonction  $h$  définie sur  $[0, 4]$ .



1. Graphiquement, déterminer  $h(1)$  et  $h(2)$ .
2. Graphiquement, résoudre  $h(x) = 2$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $h$ .
4. Dire, en justifiant la réponse, sur lesquels des intervalles suivants le théorème de la valeur intermédiaire s'applique :

$$I_1 = [0, 1]; I_2 = [0, 1[; I_3 = [0, 2]; I_4 = [1, 3].$$

**Exercice 4.** (4 points)

Soit  $b \in \mathbb{R}$ . On définit pour tout  $x \in \mathbb{R}$  le trinôme :  $\mathcal{P}_b(x) = x^2 - 2bx + 1$ .

1. Calculer le discriminant  $\Delta$  de  $\mathcal{P}_b$  (qui dépend de  $b$ ).
2. Étudier le signe de  $4b^2 - 4$  en fonction de  $b$ .
3. En déduire le nombre de solutions de  $\mathcal{P}_b(x) = 0$  en fonction de  $b$ .

---

DEVOIR 1 - 24.09.09 - SUJET B.  
Terminale ES 1, Lycée Newton, Y. Angeli

---

**Exercice 1.** (8 points)

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 12$

1. Déterminer la fonction dérivée  $f'$  de la fonction  $f$ .
2. Dresser le tableau de variation de la fonction  $f$ .
3. Montrer que sur l'intervalle  $]3; 5[$ , l'équation  $f(x) = 0$  admet une solution  $\alpha$  unique.
4. Donner un encadrement de  $\alpha$  d'amplitude  $10^{-2}$
5. Combien  $f(x) = 0$  admet-elle de solutions sur  $\mathbb{R}$ ? Justifier.

**Exercice 2.** (4 points)


On munit le plan d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  d'unité graphique 1cm. On pose pour  $x \in [0, 5]$ ,

$$g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 3 \\ 7 - x & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

1. Tracer la courbe représentative de  $g$ .
2. La fonction  $g$  est elle continue sur  $[0, 5]$ ? Justifier.

**Exercice 3.** (4 points)

La figure représente une fonction  $h$  définie sur  $[0, 4]$ .



1. Graphiquement, déterminer  $h(1)$  et  $h(2)$ .
2. Graphiquement, résoudre  $h(x) = 2$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $h$ .
4. Dire, en justifiant la réponse, sur lesquels des intervalles suivants le théorème de la valeur intermédiaire s'applique :

$$I_1 = [0, 1]; I_2 = [1, 2]; I_3 = [0, 2]; I_4 = [1, 3].$$

**Exercice 4.** (4 points)

Soit  $b \in \mathbb{R}$ . On définit pour tout  $x \in \mathbb{R}$  le trinôme :  $\mathcal{P}_b(x) = x^2 + bx + 9$ .

1. Calculer le discriminant  $\Delta$  de  $\mathcal{P}_b$  (qui dépend de  $b$ ).
2. Étudier le signe de  $b^2 - 36$  en fonction de  $b$ .
3. En déduire le nombre de solutions de  $\mathcal{P}_b(x) = 0$  en fonction de  $b$ .