

**FEUILLE D'EXERCICES 9 -26-10-12-
Terminale ES-L, 2012-2013, Y. Angeli**

EXERCICE 1. Métropole septembre 2008

Dans une kermesse un organisateur de jeux dispose de 2 roues de 20 cases chacune.

La roue A comporte 18 cases noires et 2 cases rouges.

La roue B comporte 16 cases noires et 4 cases rouges.

Lors du lancer d'une roue toutes les cases ont la même probabilité d'être obtenues. La règle du jeu est la suivante :

- Le joueur mise 1 € et lance la roue A.
 - S'il obtient une case rouge, alors il lance la roue B, note la couleur de la case obtenue et la partie s'arrête.
 - S'il obtient une case noire, alors il relance la roue A, note la couleur de la case obtenue et la partie s'arrête.
- ① Traduire l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré.
- ② Soient E et F les évènements :
- E : « à l'issue de la partie, les 2 cases obtenues sont rouges »
F : « à l'issue de la partie, une seule des deux cases est rouge ».
- Montrer que $p(E) = 0,02$ et $p(F) = 0,17$.
- ③ Si les 2 cases obtenues sont rouges le joueur reçoit 10 € ; si une seule des cases est rouge le joueur reçoit 2 € ; sinon il ne reçoit rien.
- X désigne la variable aléatoire égale au gain algébrique en euros du joueur (rappel le joueur mise 1 €).
- (a) Déterminer la loi de probabilité de X.
- (b) Calculer l'espérance mathématique de X et en donner une interprétation.
- ④ Le joueur décide de jouer n parties consécutives et indépendantes (n désigne un entier naturel supérieur ou égal à 2)
- (a) Démontrer que la probabilité p_n qu'il lance au moins une fois la roue B est telle que $p_n = 1 - (0,9)^n$.
- (b) Justifier que la suite de terme général p_n est convergente et préciser sa limite.
- (c) Quelle est la plus petite valeur de l'entier n pour laquelle $p_n > 0,9$?

EXERCICE 2. Asie juin 2010

Avant le début des travaux de construction d'une autoroute, une équipe d'archéologie préventive procède à des sondages successifs en des points régulièrement espacés sur le terrain.

Lorsque le n-ième sondage donne lieu à la découverte de vestiges, il est dit positif.

L'évènement : « le n-ième sondage est positif » est noté V_n , on note p_n la probabilité de l'évènement V_n .

L'expérience acquise au cours de ce type d'investigation permet de prévoir que :

- si un sondage est positif, le suivant a une probabilité égale à 0,6 d'être aussi positif ;
- si un sondage est négatif, le suivant a une probabilité égale à 0,9 d'être aussi négatif.

On suppose que le premier sondage est positif, c'est-à-dire : $p_1 = 1$.

- ① Calculer les probabilités des évènements suivants :
- (a) A : « les 2^e et 3^e sondages sont positifs » ;
- (b) B : « les 2^e et 3^e sondages sont négatifs ».
- ② Calculer la probabilité p_3 pour que le 3^e sondage soit positif.
- ③ n désigne un entier naturel supérieur ou égal à 2. Représenter par un arbre pondéré la situation des sondages n et n + 1.
- ④ Pour tout entier naturel n non nul, établir que : $p_{n+1} = 0,5p_n + 0,1$.
- ⑤ On note u la suite définie, pour tout entier naturel n non nul par : $u_n = p_n - 0,2$.
- (a) Démontrer que u est une suite géométrique, en préciser le premier terme et la raison.
- (b) Exprimer p_n en fonction de n.
- (c) Calculer la limite, quand n tend vers $+\infty$, de la probabilité p_n .